

# Testowy program edukacyjny

## Endometrioza a dolegliwości bólowe u kobiet

1. Endometrioza występuje w wieku rozrodczym kobiet w:

- a) 1–2%
- b) 3–4%
- c) 6–10%
- d) 10–15%

2. Ból towarzyszy pacjentkom z endometriozą w:

- a) 10%
- b) 20%
- c) 90%
- d) 66%

3. Najczęściej dolegliwości bólowe opisywane przez pacjentki to:

- a) ból związany z miesiączką
- b) dyspareunia
- c) bóle okolicy lędźwiowej
- d) wszystkie prawidłowe

4. W większości przypadków ból powraca po zakończonym leczeniu farmakologicznym po:

- a) 2 latach
- b) 1 miesiącu
- c) 6–12 miesiącach
- d) 3 latach

5. Prawdopodobną przyczyną bólu w endometriozie jest:

- a) miejscowy stan zapalny otrzewnej
- b) produkcja prostaglandyn w ogniskach ekotopowych
- c) tworzenie zrostów
- d) wszystkie prawdziwe

6. Do czynników prozapalnych i wzrostowych obecnych w płynie otrzewnowym pacjentek z endometriozą należą:

- a) interleukiny: 1; 5; 6; 8
- b) TNF- $\alpha$
- c) VEGF
- d) wszystkie wymienione

7. Inhibitory aromatazy hamują konwersję:

- a) estronu do estradiolu
- b) estronu do androstendionu
- c) androstendionu do estronu
- d) estradiolu do androstendionu

8. W tkance endometrioidalnej kobiet z endometriozą wytwarzane są w nadmiernych ilościach prostaglandyny:

- a) E<sub>2</sub>
- b) F<sub>2 $\alpha$</sub>
- c) H<sub>2</sub>
- d) wszystkie wymienione



Zakreśl prawidłową odpowiedź:

- |               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 1. a, b, c, d | 6. a, b, c, d  | 11. a, b, c, d |
| 2. a, b, c, d | 7. a, b, c, d  | 12. a, b, c, d |
| 3. a, b, c, d | 8. a, b, c, d  | 13. a, b, c, d |
| 4. a, b, c, d | 9. a, b, c, d  | 14. a, b, c, d |
| 5. a, b, c, d | 10. a, b, c, d | 15. a, b, c, d |

Wypełniony blankiet odpowiedzi należy wysłać pod adresem:

Wydawnictwo Termedia (Redakcja *Przeglądu Menopauzalnego*), ul. Kleeberga 2, 61-615 Poznań  
z dopiskiem TESTOWY PROGRAM EDUKACYJNY.

**9. Cyklooksigenaza katalizuje następującą przemianę:**

- a) kwasu arachidonowego do estriolu
- b) kwasu arachidonowego do PGE<sub>2</sub>
- c) kwasu arachidonowego do estradiolu
- d) kwasu arachidonowego do androstendionu

**10. Do selektywnych inhibitorów COX-2 należą:**

- a) rofekoksyb
- b) ibuprofen
- c) waldekoksyb
- d) prawidłowe a) i c)

**11. W tkance endometrioidalnej ekspresję COX-2 i wytwarzanie prostaglandyn zwiększają następujące czynniki:**

- a) interleukina 1β
- b) VEGF
- c) estradiol
- d) wszystkie wymienione

**12. Pierwszorazowym leczeniem bolesnych miesiączek jest stosowanie:**

- a) NLPZ
- b) złożonych tabletek antykoncepcyjnych
- c) agonistów GnRH
- d) prawidłowe a) i b)

**13. Przewlekły ból zlokalizowany w miednicy (*chronic pelvic pain*) to ból trwający:**


- a) 1 rok
- b) 6 miesięcy
- c) 4 miesiące
- d) 1 miesiąc

**14. Zabiegi mające na celu przecięcie lub zniszczenie unerwienia narządu płciowego to:**

- a) LUNA
- b) LPSN
- c) neurektomia przedkrzyżowa
- d) wszystkie prawdziwe

**15. U pacjentek, u których wykonano histerektomię z dodatkami z powodu endometriozy, HT powinna zawierać:**

- a) tylko estrogen
- b) tylko progesteron
- c) estrogen i progesteron
- d) nie stosuje się u nich HT

	Przeгляд Menopauzalny 6/2011 
Imię i nazwisko	
Stopień naukowy	
Adres miejsca pracy	
Miejsce zamieszkania	
Tel. kontaktowy, e-mail	
<p>W związku z art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU nr 133, poz. 883) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TERMEDIA sp. z o.o. i inne podmioty obecnie i w przyszłości w celach związanych z działalnością wydawniczą, w systemach informatycznych i w innych zbiorach danych, moich danych osobowych.</p>	Podpis, pieczętka  _____ podpis