

Testowy program edukacyjny

Diagnostyka i leczenie ciąży ektopowej

1. Częstość występowania ciąży ektopowej to:

- a) 5–10% wszystkich ciąż;
- b) 1–2% wszystkich ciąż;
- c) ok. 0,5% wszystkich ciąż;
- d) 10–15% wszystkich ciąż.

2. Czynnikiem zwiększającym ryzyko pojawienia się ciąży ektopowej są:

- a) operacje w obrębie jajowodu;
- b) leczenie niepłodności;
- c) przebyta ciąża ektopowa;
- d) wszystkie wymienione.

3. U pacjentek leczonych z powodu niepłodności rośnie ryzyko ciąży ektopowej o około:

- a) 5%;
- b) 10%;
- c) 2–3%;
- d) 10–20%.

4. Wskaż zdanie prawdziwe:

- a) stężenie progesteronu w surowicy poniżej 5 ng/ml może sugerować ciążę ektopową;
- b) stężenie progesteronu w surowicy powyżej 20 ng/ml nie wyklucza obecności ciąży ektopowej;
- c) stężenie progesteronu w surowicy nie ma znaczenia diagnostycznego w ciąży ektopowej;
- d) prawdziwe są zdania a i b.

5. Markerami wczesnego wykrywania ciąży ektopowej wydają się:

- a) aktywina A;
- b) fibronektyna;
- c) glikodelina;
- d) wszystkie wymienione.

6. Ciąża szyjkowa częściej pojawia się u pacjentek:

- a) stosujących wkładkę wewnątrzmaciczną;
- b) po instrumentalnym rozszerzaniu szyjki macicy;
- c) mających zrosty wewnątrzmaciczne;
- d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.

7. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące metotreksatu:

- a) jest antagonistą kwasu foliowego;
- b) jest agonistą kwasu foliowego;
- c) hamuje syntezę DNA;
- d) ma większe powinowactwo do reduktazy dwuhydrofolanu od kwasu foliowego.

8. Stosowanie metotreksatu w ciąży ektopowej wydaje się najbardziej skuteczne, jeżeli stężenie gonadotropiny kosmówkowej β (β -HCG) wynosi:

- a) poniżej 5000 mUI/ml;
- b) powyżej 5000 mUI/ml;
- c) 5–10 000 mUI/ml;
- d) 5–7000 mUI/ml.



Zakreśl prawidłową odpowiedź:

- | | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 1. a, b, c, d | 6. a, b, c, d | 11. a, b, c, d |
| 2. a, b, c, d | 7. a, b, c, d | 12. a, b, c, d |
| 3. a, b, c, d | 8. a, b, c, d | 13. a, b, c, d |
| 4. a, b, c, d | 9. a, b, c, d | 14. a, b, c, d |
| 5. a, b, c, d | 10. a, b, c, d | 15. a, b, c, d |

Wypełniony blankiet odpowiedzi należy wysłać pod adresem:

Wydawnictwo Termedia (Redakcja *Przeglądu Menopauzalnego*), ul. Kleeberga 2, 61-615 Poznań
z dopiskiem TESTOWY PROGRAM EDUKACYJNY.

9. Do najczęstszych objawów ubocznych terapii metotreksatem należą:

- a) biegunka i objawy dyspeptyczne;
- b) podwyższenie enzymów wątrobowych;
- c) zapalenie błony śluzowej żołądka, skóry;
- d) wszystkie wymienione.

10. Bezwzględny przeciwwskazaniem do stosowania metotreksatu jest:

- a) średnica zmiany w przydatkach powyżej 3,5 cm;
- b) średnica zmiany w przydatkach powyżej 2,5 cm;
- c) widoczna czynność serca w pęcherzyku ciążowym;
- d) prawidłowe są a i c.

11. Jednorazowa dawka metotreksatu to:

- a) 40 mg na m² p.c.;
- b) 70 mg na m² p.c.;
- c) 50 mg na m² p.c.;
- d) 20 mg na m² p.c.

12. Alternatywą dla metotreksatu w leczeniu ciąży szyjkowej może być:

- a) leczenie operacyjne;
- b) podanie 15-procentowego KCl do pęcherzyka ciążowego;
- c) podanie 10-procentowej glukozy do pęcherzyka ciążowego;
- d) prawidłowe są a i b.

13. W schemacie wielokrotnych podań metotreksatu przyjmuje się, że zmniejszenie stężenia gonadotropiny kosmówkowej β (β -HCG), przy którym należy podać kolejną dawkę, wynosi:


- a) poniżej 20%;
- b) poniżej 15%;
- c) poniżej 25%;
- d) poniżej 30%.

14. Po leczeniu ciąży ektopowej metotreksatem zasadne wydaje się planowanie kolejnej ciąży po:

- a) roku;
- b) 6 miesiącach;
- c) 3 miesiącach;
- d) 2 latach.

15. Należy pamiętać, że dolegliwości bólowe podbrzusza po podaniu metotreksatu zgłasza około:

- a) 50% pacjentek;
- b) 20% pacjentek;
- c) 75% pacjentek;
- d) 10% pacjentek.

	Przeгляд Menopauzalny 4/2012 
Imię i nazwisko	
Stopień naukowy	
Adres miejsca pracy	
Miejsce zamieszkania	
Tel. kontaktowy, e-mail	
<p><small>W związku z art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU nr 133, poz. 883) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TERMEDIA sp. z o.o. i inne podmioty obecnie i w przyszłości w celach związanych z działalnością wydawniczą, w systemach informatycznych i w innych zbiorach danych, moich danych osobowych.</small></p>	Podpis, pieczęćka _____ podpis