

DulcoSoft®Junior, roztwór doustny, makrogl 4000. Zastosowanie: objawowe leczenie ostrych i przewlekłych zaparć, zmiękczenie twardej masy kałowej. Dawkowanie: Dorośli i dzieci powyżej 8 lat: 20 – 40 ml roztworu na dobę (co odpowiada 10 – 20 g makroglu 4000). Dzieci 4 - 7 lat: 16 – 32 ml roztworu na dobę (co odpowiada 8 – 16 g makroglu 4000). Dzieci 2- 3 lata: 8 – 16 ml roztworu na dobę (co odpowiada 4 – 8 g makroglu 4000), Dzieci powyżej 6. miesiąca do roku: 8 ml roztworu na dobę (co odpowiada 4 g makroglu 4000); najlepiej w pojedynczej dawce przyjmowanej rano. Produkt można mieszać z wybranym napojem, np. ze szklanką wody, soku owocowego lub herbaty (około 150 ml). Ze względu na mniejszą dawkę dzienną dla dzieci (poniżej 3 lat), ilość płynu można zmniejszyć do 50 ml (przy stosowaniu 8 ml roztworu) lub 100 ml (przy stosowaniu 16 ml roztworu), należy zawsze zapewnić odpowiednią podaż płynów. Producent: Hälsa Pharma GmbH. Dystrybutor: Opella Healthcare Poland Sp. z o. o.