

Testowy program edukacyjny

Objawy uboczne stosowania tamoksyfenu i raloksyfenu

1. Zalecany czas stosowania tamoksyfenu w leczeniu uzupełniającym raka piersi wynosi:

- a) 10 lat;
- b) 2 lata;
- c) 3 lata;
- d) 5 lat.

2. Tamoksyfen powoduje:

- a) zmniejszenie stężenia antytrombiny III;
- b) zmniejszenie stężenia cholesterolu i LDL;
- c) zwiększenie stężenia białka wiążącego hormony płciowe (*sex hormone binding globulin* – SHBG) i innych globulin wiążących;
- d) wszystkie wymienione.

3. Najczęstsze działania niepożądane tamoksyfenu to:

- a) uderzenia gorąca;
- b) suchość pochwy;
- c) wzrost ryzyka przerostów i raka endometrium;
- d) wszystkie wymienione.

4. Podczas terapii tamoksyfenem ryzyko rozwoju raka endometrium rośnie:

- a) trzykrotnie;
- b) dwukrotnie;
- c) dziesięciokrotnie;
- d) ponad dziesięciokrotnie.

5. Grubość endometrium u pacjentek niemających objawów, stosujących tamoksyfen, u których powinno się rozpocząć dalszą diagnostykę, wynosi:

- a) 5 mm;
- b) 2 mm;
- c) 10 mm;
- d) 8 mm.

6. Wskaż zdanie prawdziwe:

- a) Ryzyko rozwoju raka endometrium jest uzależnione od czasu trwania leczenia tamoksyfenem.
- b) Ryzyko rozwoju raka endometrium jest uzależnione od dawki tamoksyfenu.
- c) Ryzyko rozwoju raka endometrium nie zależy od czasu terapii i dawki tamoksyfenu.
- d) Prawdziwe są zdania a) i b).

7. Raloksyfen w porównaniu z placebo zmniejsza ryzyko rozwoju inwazyjnego zawierającego receptory estrogenu raka piersi o około:

- a) 20%;
- b) 30%;
- c) 55%;
- d) 80%.



Zakreśl prawidłową odpowiedź:

1. a, b, c, d

2. a, b, c, d

3. a, b, c, d

4. a, b, c, d

5. a, b, c, d

6. a, b, c, d

7. a, b, c, d

8. a, b, c, d

9. a, b, c, d

10. a, b, c, d

11. a, b, c, d

12. a, b, c, d

13. a, b, c, d

14. a, b, c, d

15. a, b, c, d

Wypełniony blankiet odpowiedzi należy wysłać pod adresem:

Wydawnictwo Termedia (Redakcja *Przeglądu Menopauzalnego*), ul. Kleeberga 2, 61-615 Poznań
z dopiskiem TESTOWY PROGRAM EDUKACYJNY.

8. Wskaż zdanie prawdziwe:

- a) Raloksyfen zwiększa ryzyko rozwoju raka endometrium.
- b) Raloksyfen zmniejsza ryzyko rozwoju raka endometrium.
- c) Raloksyfen podobnie jak tamoksyfen zwiększa ryzyko rozwoju raka endometrium.
- d) Raloksyfen zwiększa ryzyko rozwoju raka endometrium po 6 latach stosowania.

9. Pacjentki stosujące tamoksyfen narażone są na częstsze występowanie:

- a) raka endometrium;
- b) mięsaka macicy;
- c) endometriozę;
- d) wszystkich wymienionych.

10. Terapia raloksyfenem nie powoduje:

- a) uderzeń gorąca;
- b) atrofi pochwy;
- c) stanów zapalnych pochwy i pęcherza moczowego;
- d) wzrostu ryzyka rozwoju raka endometrium.

11. Objawy naczynioruchowe u pacjentek stosujących tamoksyfen występują w:

- a) 50% przypadków;
- b) 25% przypadków;
- c) 80% przypadków;
- d) 15% przypadków.

12. W łagodzeniu objawów wypadowych podczas terapii tamoksyfenem mogą być stosowane:

- a) leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwyty serotoniny;
- b) leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwyty norpinefryny;
- c) gestageny;
- d) prawidłowe są odpowiedzi a) i b).

13. Do leków z grupy selektywnych inhibitorów wychwyty serotoniny należą:

- a) fluoksetyna;
- b) paroksetyna;
- c) wenlafaksyna;
- d) wszystkie wymienione.

14. Gabapentyna może być wykorzystana do zmniejszenia takich objawów, jak:

- a) atrofia pochwy;
- b) uderzenia gorąca;
- c) stany zapalne pochwy;
- d) suchość śluzówek.

15. U pacjentek z rakiem piersi leczonych tamoksyfenem nie można stosować:

- a) miejscowych estrogenów;
- b) nawilżających preparatów dopochwowych;
- c) pluskwicy groniastej, izoflawonów;
- d) witaminy E w dawce 800 IU/dobę.

Imię i nazwisko

Stopień naukowy

Adres miejsca pracy

Miejsce zamieszkania

Tel. kontaktowy, e-mail

Przeгляд Menopauzalny 2/2012

Podpis, pieczęćka

podpis

W związku z art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU nr 133, poz. 883) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TERMEDIA sp. z o.o. i inne podmioty obecnie i w przyszłości w celach związanych z działalnością wydawniczą, w systemach informatycznych i w innych zbiorach danych, moich danych osobowych.