

Testowy program edukacyjny

Choroby sromu – diagnostyka i leczenie

1. **Kobietom z liszajem twardzinowym sromu często towarzyszą choroby autoimmunologiczne, takie jak:**
 - a) choroby tarczycy;
 - b) łysienie plackowate;
 - c) cukrzyca typu 1;
 - d) wszystkie wymienione.
2. **Częstość rodzinnego występowania chorób o podłożu autoimmunologicznym u pacjentek z liszajem twardzinowym wynosi:**
 - a) 10%;
 - b) 20%;
 - c) 30%;
 - d) 5%.
3. **Wskaż zdanie prawdziwe:**
 - a) śródnabłonkową neoplazję sromu rozpoznajemy na podstawie objawów klinicznych;
 - b) przy podejrzeniu śródnabłonkowej neoplazji sromu należy wykonać biopsję;
 - c) śródnabłonkowa neoplazja sromu jest rozpoznaniem histopatologicznym;
 - d) prawidłowe b i c.
4. **W diagnostyce zapaleń skóry sromu powinno się oznaczyć w surowicy stężenie:**
 - a) hormonu luteinizującego;
 - b) ferrytyny;
 - c) androstendionu;
 - d) hormonu folikulotropowego.
5. **Najczęstszymi alergenami okolicy sromu są:**
 - a) kosmetyki;
 - b) leki;
 - c) konserwanty;
 - d) wszystkie wymienione.
6. **W leczeniu pierwszorazowym liszaja twardzinowego stosuje się:**
 - a) hydrokortyzon;
 - b) klobetazol;
 - c) flukonazol;
 - d) ekonazol.
7. **Częstość nawrotów liszaja twardzinowego po zakończeniu leczenia w ciągu 4 lat wynosi:**
 - a) 10%;
 - b) 20%;
 - c) 80%;
 - d) 5%.



Zakreśl prawidłową odpowiedź:

- | | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 1. a, b, c, d | 6. a, b, c, d | 11. a, b, c, d |
| 2. a, b, c, d | 7. a, b, c, d | 12. a, b, c, d |
| 3. a, b, c, d | 8. a, b, c, d | 13. a, b, c, d |
| 4. a, b, c, d | 9. a, b, c, d | 14. a, b, c, d |
| 5. a, b, c, d | 10. a, b, c, d | |

Wypełniony blankiet odpowiedzi należy wysłać pod adresem:

Wydawnictwo Termedia (Redakcja *Przeglądu Menopauzalnego*), ul. Kleeberga 2, 61-615 Poznań
z dopiskiem TESTOWY PROGRAM EDUKACYJNY.

8. Mechanizm działania inhibitorów kalcyneuryny polega na:

- a) supresji odpowiedzi limfocytów T;
- b) supresji odpowiedzi limfocytów B;
- c) aktywacji odpowiedzi limfocytów T;
- d) aktywacji odpowiedzi limfocytów B.

**9. Lekiem drugiego rzutu w przebiegu liszaja twardzino-
wego jest:**

- a) hydrokortyzon;
- b) takrolimus;
- c) metotreksat;
- d) taksol.

10. W leczeniu liszaja twardzinowego nie jest zalecane:

- a) leczenie operacyjne;
- b) leczenie hydrokortyzonem;
- c) waporyzacja laserem CO₂;
- d) prawdziwe a i c.

11. Wskaż zdanie fałszywe:

- a) złotym standardem leczenia śród nabłonkowej neoplazji sromu jest wycięcie miejscowe zmiany;
- b) dopuszczalne jest leczenie nieoperacyjne śród nabłonkowej neoplazji sromu;
- c) śród nabłonkową neoplazję sromu leczymy tylko zachowawczo;
- d) śród nabłonkowa neoplazja sromu wymaga regularnej długotrwałej obserwacji.

12. Po wycięciu ognisk śród nabłonkowej neoplazji sromu obecność raka inwazyjnego w preparatach szacuje się na:

- a) 1–2%;
- b) 5–8%;
- c) 0,5–1%;
- d) 12–17%.

13. W przypadku stwierdzenia śród nabłonkowej neoplazji sromu należy bezwzględnie wykonać:

- a) ocenę biocenozy pochwy;
- b) cytologię i kolposkopię;
- c) pobranie wycinka z szyjki macicy;
- d) wyżęczkowanie kanału i jamy macicy.

14. Do rzadkich chorób skóry okolicy sromu należy:

- a) choroba Behçeta;
- b) choroba Pageta;
- c) choroba Zoona;
- d) każda z wyżej wymienionych.

Imię i nazwisko

Stopień naukowy

Adres miejsca pracy

Miejsce zamieszkania

Tel. kontaktowy, e-mail

Przeгляд Menopauzalny 2/2013

Podpis, pieczęćka

podpis

W związku z art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU nr 133, poz. 883) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TERMEDIA sp. z o.o. i inne podmioty obecnie i w przyszłości w celach związanych z działalnością wydawniczą, w systemach informatycznych i w innych zbiorach danych, moich danych osobowych.