

# Testowy program edukacyjny

## Poronienia samoistne

1. Mimo że sam obraz USG dopochwowego nie daje czasami jednoznacznej diagnozy, jednak pewne wykładniki mogą sugerować poronienie zagrażające, należą do nich m.in.:

- a) pęcherzyk ciążyowy o nieregularnych zarysach, zniekształcony      b) bradykardia u płodu  
c) pęcherzyk nisko usadowiony w jamie macicy      d) wszystkie wymienione

2. Anomalie w strukturze chromosomów odpowiadają za ok. 6% niepowodzeń ciąży, wśród nich z poronieniami wiążą się:

- a) translokacje      b) delecje  
c) duplikacje      d) translokacje i delecje

3. Aneuploidia jest uważana za główną przyczynę poronień samoistnych, najczęściej zaś występuje:

- a) polyploidia      b) monosomia X  
c) trisomia      d) żadna z wymienionych

4. Prawdą jest, że:

- a) heparyna nie przechodzi przez barierę łożyskową, natomiast aspiryna tak      b) w leczeniu zespołu antyfosfolipidowego poleca się podawanie samej tylko aspiryny  
c) właściwym postępowaniem jest terapia łącząca heparynę z aspiryną      d) prawdziwe odpowiedzi to a i c

5. Badania konieczne w diagnostyce poronień nawracających to:

- a) badania w kierunku zakażenia toksoplazmozą, opryszczką, cytomegalowirusem      b) badania oceniające funkcję tarczycy  
c) badania poziomu prolaktyny      d) żadne z wymienionych

6. Do zdiagnozowania zespołu antyfosfolipidowego konieczne jest:

- a) współistnienie zarówno laboratoryjnych, jak i klinicznych kryteriów, tj. zakrzepicy czy niepowodzeń ciąży w wywiadzie      b) wystarczy potwierdzenie laboratoryjne – zwiększone stężenie przeciwciał antykariolinowych lub obecność antykoagulantu tocznia  
c) wskazanie przynajmniej jednego kryterium klinicznego wraz z jednym kryterium laboratoryjnym      d) prawdziwe odpowiedzi to a i c

**Zakreśl prawidłową odpowiedź:**

- |               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 1. a, b, c, d | 6. a, b, c, d  | 11. a, b, c, d |
| 2. a, b, c, d | 7. a, b, c, d  | 12. a, b, c, d |
| 3. a, b, c, d | 8. a, b, c, d  | 13. a, b, c, d |
| 4. a, b, c, d | 9. a, b, c, d  | 14. a, b, c, d |
| 5. a, b, c, d | 10. a, b, c, d | 15. a, b, c, d |

Wypełniony blankiet odpowiedzi należy wysłać pod adresem:

Wydawnictwo Termedia (Redakcja *Przeglądu Menopauzalnego*), ul. Wenedów 9/1, 61-614 Poznań  
z dopiskiem TESTOWY PROGRAM EDUKACYJNY.

**7. Zdanie prawdziwe to:**

- a) wraz ze wzrostem liczby nawracających poronień częstość chromosomalnych nieprawidłowości zarodka spada
- b) wraz ze wzrostem liczby nawracających poronień częstość chromosomalnych nieprawidłowości zarodka zamiennie wzrasta
- c) nieprawidłowości w kariotypie poronionego płodu są dobrym prognostykiem dla kolejnej ciąży
- d) prawdziwe odpowiedzi to a i c

**8. Za najczęstszą wadę wrodzoną macicy mającą związek ze zwiększonym ryzykiem poronień nawracających uważa się:**

- a) macicę jednoróżną
- b) macicę dwurożną
- c) macicę podzieloną
- d) macicę podwójną

**9. Zaawansowany wiek matki w chwili poczęcia jest czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia:**

- a) porodu przedwczesnego
- b) poronienia spontanicznego
- c) ciąży pozamacicznej
- d) wszystkich wymienionych

**10. Przeciwciała antyfosfolipidowe APA należą do następującej klasy:**

- a) tylko IgG
- b) tylko IgM
- c) tylko IgA
- d) mogą to być IgG, IgM, jak i IgA

**11. W dyskusji na temat związku poronień z wiekiem matki na plan pierwszy wysuwa się obecnie argument:**

- a) starzenia się endometrium
- b) gorszej jakości komórek jajowych
- c) częstszych zaburzeń hormonalnych
- d) częstszych ciąż pozamacicznych

**12. Wśród najczęstszych czynników odpowiadających, oprócz immunologicznych, za poronienia nawykowe wymienia się:**

- a) czynniki infekcyjne
- b) czynniki środowiskowe
- c) zaburzenia genetyczne
- d) wrodzone i nabyte wady anatomiczne macicy

**13. Najczęściej występującą w populacji trombofilią wrodzoną, która ma związek z poronieniami nawracającymi jest:**

- a) zespół antyfosfolipidowy
- b) mutacja genu protrombiny G20210A
- c) niedobór białka S
- d) mutacja czynnika V typu Leiden G 1691A

**14. Prawdą jest, że:**

- a) wywiad w kierunku trombofilii należy przeprowadzać u każdej kobiety z poronieniami nawracającymi
- b) w etiologii poronień idiopatycznych zaburzenia o charakterze trombofilii stanowią znaczący procent
- c) w leczeniu poronień nawracających na podłożu trombofilii stosujemy leczenie wyłącznie heparyną
- d) prawdziwe odpowiedzi to a i b

**15. Prawdą jest, że:**

- a) hiperprolaktynemia jest izolowanym czynnikiem ryzyka poronień nawracających
- b) supresja LH przed ciążą u kobiet z PCOS zwiększa odsetek żywych urodzeń
- c) potwierdzono, że czynnik psychoemocjonalny odgrywa dużą rolę w etiologii poronień
- d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe



.....  
Imię i nazwisko

.....  
Stopień naukowy

.....  
Adres miejsca pracy

.....  
Adres zamieszkania

.....  
Tel. kontaktowy, e-mail

.....  
Podpis, pieczętka

.....  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Termedia sp. z o.o.  
i wykorzystanie ich w celach marketingowych (DzU nr 133/97, poz. 883).

.....  
podpis