





Leczysz serce,  
**pamiętaj o nerce**







Szczególnie u pacjentów  
z cukrzycą

# Odsetek pacjentów z **rozpoznaną cukrzycą**

w zależności od województwa<sup>1</sup>




-  – powyżej 5%
-  – między 4,5% a 4,9%
-  – między 4% a 4,3%
-  – poniżej 3,9%

Dane dotyczą liczby pacjentów z uwzględnioną w dokumentacji medycznej diagnozą cukrzycy wg kodów ICD 10.

1. Walicka M, Chlebus M, Brzozowska M et al. Prevalence of diabetes in Poland in the years 2010–2014. Clin Diabet 2015; 4, 6: 232–237.

## Ramipril zmniejsza **ryzyko jawnej nefropatii\*** u pacjentów z cukrzycą<sup>2</sup>



\*nefropatia definiowana jako albuminy  $\geq 300$  mg lub białko całkowite  $\geq 500$  mg w dobowej zbiórce moczu, lub wskaźnik albumina/kreatynina  $> 36$  mg/mmol, gdy nie udało się przeprowadzić dobowej zbiórki moczu

**ACE inhibitory to leki pierwszego wyboru** w leczeniu pacjentów z NT i współistniejącą niecukrzycową/cukrzycową przewlekłą chorobą nerek.<sup>3</sup>

2. Effects of ramipril on cardiovascular and microvascular outcomes in people with diabetes mellitus: results of the HOPE study and MICRO-HOPE substudy. Lancet 2000; 355: 253–9.

3. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym – 2019 rok. Nadciśnienie tętnicze w praktyce rok 2019; tom 5, nr 1, str. 1–84.

