

 **RIMAL**
ramipril + amlodypina



**PODWÓJNIE
POMYSŁOWY
W DZIAŁANIU**

 **polpharma**

RAMIPRIL

- Skutecznie zapobiega incydom sercowo-naczyniowym¹
- Korzystnie wpływa na gospodarkę węglowodanową¹
- Działa nefroprotekcynie²



AMLODYPINA

- Skutecznie obniża ciśnienie tętnicze³
- Utrzymuje działanie hipotensyjne dłużej niż 24 h od podania^{3,*}
- Zapewnia równomierny efekt hipotensyjny w ciągu doby³

Ocena skuteczności ramiprilu w porównaniu z placebo w grupie pacjentów z cukrzycą i NT.⁴

Zmniejszenie śmiertelności sercowo-naczyniowej

-37%

Zmniejszenie śmiertelności całkowitej

-24%

Zmniejszenie liczby udarów

-33%

Średnie ciśnienie skurczowe wynosiło w grupie ramiprilu 141,7 mm Hg, w grupie placebo 142,3. Odsetek pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w momencie włączenia do badania wynosił 58% w grupie ramiprilu i 54% w grupie placebo. Odsetek pacjentów z cukrzycą typu 2 w momencie włączenia do badania wynosił 98% w grupie ramiprilu i 97% w grupie placebo.

Porównanie średnich wartości ciśnienia w zapisie ABPM przed rozpoczęciem leczenia i po 12 tygodniach stosowania amlodypiny



