


Tylko Debutir zapewnia kontrolowane uwalnianie maślanu sodu na całej długości przewodu pokarmowego.⁷



Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego
**Debutir
Forte**

1. Wysoka dawka
2. Szerokie wskazania
3. Kontrolowane uwalnianie na całej długości przewodu pokarmowego

Przypisy :

1. Banasiewicz T et al. Determination of butyric acid dosage based on clinical and experimental studies – a literature review. *Gastroenterology Rev.* 2020; 15(2):119–125.
2. Banasiewicz T i wsp. Kliniczne aspekty zastosowania kwasu masłowego w postępowaniu dietetycznym w chorobach jelit. *Prz Gastroenterol.* 2010; 5(6):329-334.
3. Guilloteau P et al. From the gut to the peripheral tissues: the multiple effects of butyrate. *Nutr Res Rev.* 2010; 23(2):366-84.
4. PIL Debutir Forte; PIL Butiner 500; PIL Gastrobutin IBS.
5. Banasiewicz T i wsp. Porównanie profili uwalniania maślanu sodu w jelicie dla produktów dostępnych na polskim rynku. *Farmacja Praktyczna* 2019; 12-1(119): 40-42.
6. Patent PL233287.
7. Banasiewicz T i wsp. Badanie porównujące profil uwalniania się w jelicie aktualnie dostępnych na rynku polskim produktów zawierających maślan sodu. *Medycyna Faktów.* 2017; 4(37).

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego
**Debutir
Forte**

300
x dwa
W JELITACH
RADE DA



1 W wielu stanach i chorobach jelit stężenie endogennego kwasu masłowego **jest niewystarczające dla pokrycia zapotrzebowania i utrzymania homeostazy jelitowej.**¹⁻³

TYLKO DEBUTIR FORTE
POSIADA SZEROKIE
ZALECENIA DO POSTĘPOWANIA
DIETETYCZNEGO
W CHOROBAH JELIT⁴



Maślan sodu zaleca się do postępowania dietetycznego w stanach takich jak: ⁴

	Debutir Forte	Butiner 500
Choroby czynnościowe jelit t.j.: zespół jelita nadwrażliwego, zaparcie, bóle brzucha, wzdęcie brzucha	✓	✓
Ostre biegunki różnego pochodzenia	✓	—
Choroba uchyłkowa	✓	—
Nieswoiste choroby zapalne jelit	✓	✓
Zapalenie jelit po radioterapii i/lub chemioterapii	✓	—
Stany po operacjach chirurgicznych w obrębie przewodu pokarmowego	✓	—
Zaburzenia składu mikrobioty jelitowej m.in. w trakcie i po antybiotykoterapii	✓	✓
Niedobory pokarmowe (niedostateczna podaż błonnika pokarmowego, dieta ubogoresztkowa)	✓	✓

Porównanie przeznaczenia dostępnych na polskim rynku kapsułek i tabletek z zawartością maślanu sodu powyżej 150 mg w statusie żywności specjalnego przeznaczenia medycznego.


2 Standardowa dawka suplementacyjna maślanu sodu (150 mg 2x/d) **pokrywa maksymalnie do 15-30%** dobowego zapotrzebowania jelita w stanie fizjologicznym **i jest często niewystarczająca w stosunku do potrzeb.**¹

TYLKO DEBUTIR FORTE
ZAWIERA AŻ 300 MG
MAŚLANU SODU
W WYGODNEJ
FORMIE KAPSUŁKI



W badaniach wykazano, że stosowanie diety z wysoką, ponadstandardową dawką maślanu sodu, zwiększa istotnie jego efekt odżywczy i wpływa korzystnie na uzyskanie remisji zaburzeń.¹

3 Kwas masłowy produkowany przez bakterie **w jelicie grubym** jest głównym materiałem energetycznym dla komórek nabłonka jelit.



TYLKO DEBUTIR FORTE
UMOŻLIWIA DOSTARCZENIE
PONAD 50% DAWKI
MAŚLANU DO JELITA
GRUBEGO⁵⁻⁶

To dzięki **najnowszej opatentowanej formule mikrootoczkowania maślanu sodu** Debutir Forte zapewnia kontrolowane uwalnianie maślanu w przewodzie pokarmowym i **dostarczanie ponad 50% dawki maślanu do jelita grubego.**⁵⁻⁶