



Należy uważnie zapoznać się z treścią informacji przed rozpoczęciem terapii medyczną marihuaną, ponieważ zawiera ona ważne treści dla pacjenta.

Na początku stosowania medycznej marihuany (od kilku dni do 6 tygodni) mogą wystąpić działania niepożądane ze strony/z zakresu:

1. Ośrodkowego układu nerwowego: bóle i zawroty głowy, zmęczenie, senność, zaburzenia koordynacji ruchowej oraz wydajności motorycznej, zaburzenia pamięci krótkotrwałej oraz przetwarzania informacji, zmieniony osąd, trudności w koncentracji, zaburzenia samooceny;
2. Układu krążenia: tachykardia, obwodowe rozszerzenie naczyń krwionośnych z niedociśnieniem ortostatycznym oraz nadciśnieniem tętniczym w pozycji leżącej;
3. Układu pokarmowego: suchość w ustach (działanie antycholinergiczne), nudności, wymioty, zmiana apetytu, zaburzenia perystaltyki jelit;
4. Psychiatrii: paranoja, lęk, stany niepokoju, silne objawy psychotyczne.

Stosowanie medycznej marihuany powinno być bezwzględnie przeciwwskazane w przypadku:

- nadwrażliwości na kannabinoidy,
- występowania w wywiadzie pacjenta lub najbliższej rodziny schizofrenii/innych psychoz,
- zaburzeń osobowości czy innych schorzeń psychicznych, różnych od depresji,
- ciąży i karmienia piersią,
- dzieci i młodzieży.

Uwagi do terapii:




DZIENNIK TERAPII
medyczną marihuaną
dla Pacjenta

IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA

LEKARZ PROWADZĄCY

Cannabis Extractum Normatum THC



Dzień	Przyjęta dawka	Początek działania	Czas trwania efektu	Skala objawów
1				PRZED PO
2				PRZED PO
3				PRZED PO
4				PRZED PO
5				PRZED PO
6				PRZED PO
7				PRZED PO
8				PRZED PO
9				PRZED PO
10				PRZED PO
11				PRZED PO
12				PRZED PO
13				PRZED PO
14				PRZED PO

15				PRZED PO
16				PRZED PO
17				PRZED PO
18				PRZED PO
19				PRZED PO
20				PRZED PO
21				PRZED PO
22				PRZED PO
23				PRZED PO
24				PRZED PO
25				PRZED PO
26				PRZED PO
27				PRZED PO
28				PRZED PO
29				PRZED PO
30				PRZED PO
31				PRZED PO