

[illegible]

Rodzaj zakażenia	Dawka cefazydymu/awibaktamu	Częstość podawania	Czas trwania wlewu	Czas trwania leczenia
Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej ²	2 g/0,5 g	Co 8 godzin	2 godziny	5-14 dni
Powikłane zakażenia układu moczowego, w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek ³	2 g/0,5 g	Co 8 godzin	2 godziny	5-10 dni ⁴
Śpitalne zapalenie płuc, w tym respiratorowe zapalenie płuc ⁴	2 g/0,5 g	Co 8 godzin	2 godziny	7-14 dni
Zakażenia wywołane śluzowymi drobnoustrojami Gram-ujemnymi u pacjentów z ograniczonymi opcjami terapeutycznymi ^{2,5}	2 g/0,5 g	Co 8 godzin	2 godziny	Zależnie od ciężkości zakażenia, rodzaju patogenu(ów) wywołujących zakażenie oraz odpowiedzi klinicznej i mikrobiologicznej na leczenie ⁶

Tabela 2. Zalecane dawki dożylnie u pacjentów z szacowanym CrCL ≤ 50 ml/min¹

Stacjonarny klirens kreatyniny CrCL (ml/min)	Schemat dawkowania ²	Częstość dawkowania	Czas trwania wlewu
31-50	1 g/0,25 g	Co 8 godzin	2 godziny
16-30	0,75 g/0,1875 g	Co 12 godzin	2 godziny
6-15	0,75 g/0,1875 g	Co 24 godziny	2 godziny
Pacjenci ze schyłkową niewydolnością nerek, w tym poddawani hemodializie ³	0,75 g/0,1875 mg	Co 48 godzin	2 godziny